



Durée : 67 minutes

Analyse I

Test intermédiaire

Automne 2016

SCIPER: 12345678

Attendez le début de l'épreuve avant de tourner la page. Ce document est imprimé recto-verso, il contient 4 pages, les dernières pouvant être vides. Ne pas dégrafer.


- Posez votre carte d'étudiant sur la table.
- **Aucun** document n'est autorisé.
- L'utilisation d'une **calculatrice** et de tout outil électronique est interdite pendant l'épreuve.
- Pour les questions à **choix multiple**, on comptera :
 - +3 points si la réponse est correcte,
 - 0 point si la question n'est pas répondue ou s'il y a plusieurs croix,
 - 1 point si la réponse est incorrecte.
- Pour les questions de type **vrai-faux**, on comptera :
 - +1 point si la réponse est correcte,
 - 0 point si la question n'est pas répondue ou s'il y a plusieurs croix,
 - 1 point si la réponse est incorrecte.
- Utilisez un **stylo** à encre **noire ou bleu foncé** et effacez proprement avec du **correcteur blanc** si nécessaire.
- Si une question est erronée, l'enseignant se réserve le droit de l'annuler.
- Respectez les consignes suivantes pour **marquer vos réponses** :

oui | ja | sì | yes



non | nein | non | no





Première partie, questions à choix multiple

Pour chaque question mettre une croix dans la case correspondant à la réponse correcte sans faire de ratures. Il n'y a qu'**une seule** réponse correcte par question.

Question 1 : Soit la suite numérique bornée (x_n) définie par $x_n = \frac{5 + 3^{n+1}}{1 + (-3)^n}$. Alors

- $\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n = -7$
- $\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n = 4$
- la suite (x_n) converge
- $\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n = -3$

Question 2 : La limite $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}\right)^n$ vaut

- e
- 1
- e^{-2}
- 0

Question 3 : Soit le sous-ensemble $E \subset \mathbb{R}$ défini par $E = \left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-1} : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}$.

Alors

- Sup $E = 1$ et Inf $E = \frac{1}{2}$
- Sup $E \notin E$ et Inf $E \notin E$
- Sup $E = 1$ et Inf $E = 0$
- Sup $E = 2$ et Inf $E = \frac{1}{2}$

Question 4 : Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. On définit la somme $S_n = \sum_{k=1}^{2n+1} (-1)^k k$.

Alors on a

- $S_n = n$
- $S_n = -n - 1$
- $S_n = -1$
- $S_n = -n$

Question 5 : Soient $d \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ et la série numérique $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n!)^d}{(d \cdot n)!}$.

- La série converge uniquement pour $d = 2$
- La série converge pour tout d
- La série diverge pour tout $d \leq 5$
- La série converge pour tout $d \geq 2$



Question 6 : Soit la fonction $f: [-\frac{1}{6}, \frac{1}{6}] \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{\sqrt{1+6x}-1}{\sin(2x)}$.

S'il existe, soit $g: [-\frac{1}{6}, \frac{1}{6}] \rightarrow \mathbb{R}$ le prolongement par continuité en 0 de f .
Alors

- f n'admet pas de prolongement par continuité en 0
- g existe et $g(0) = 1$
- g existe et $g(0) = \frac{3}{2}$
- g existe et $g(0) = \frac{1}{2}$

Question 7 : Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $y \in \mathbb{R}$ tels que $x + iy \neq i$, le nombre complexe $z = x + iy$ vérifie

- $\operatorname{Re}\left(\frac{z^2}{i-z}\right) = \frac{-2xy(1-y) + x(x^2 - y^2)}{x^2 + (1-y)^2}$
- $\operatorname{Re}\left(\frac{z^2}{i-z}\right) = \frac{-2xy(1+y) - x(x^2 - y^2)}{x^2 + (1+y)^2}$
- $\operatorname{Re}\left(\frac{z^2}{i-z}\right) = \frac{2xy(1-y) - x(x^2 - y^2)}{x^2 + (1-y)^2}$
- $\operatorname{Re}\left(\frac{z^2}{i-z}\right) = \frac{2xy(1+y) + x(x^2 - y^2)}{x^2 + (1+y)^2}$

Question 8 : La série numérique $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{3^n + n}$

- diverge et la série numérique $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{2^n}{3^n + n}$ converge
- converge et $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{3^n + n} > 6$
- converge et $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{3^n + n} < 3$
- diverge et la série numérique $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{2^n}{3^n + n}$ diverge



Deuxième partie, questions du type Vrai ou Faux

Pour chaque question, mettre une croix (sans faire de ratures) dans la case VRAI si l'affirmation est **toujours vraie** ou dans la case FAUX si elle **n'est pas toujours vraie** (c'est-à-dire, si elle est parfois fausse).

Question 9 : Soit $x_0 \in \mathbb{R}$ et soit la suite (x_n) définie de manière récursive par $x_{n+1} = \frac{1}{4}x_n + 1$ pour $n \in \mathbb{N}$. Alors, pour tout choix de x_0 , la suite (x_n) est convergente.

VRAI FAUX

Question 10 : Soit (a_n) une suite de nombres réels avec $a_n \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Si la série numérique $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ converge, alors la série numérique $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n^2$ converge.

VRAI FAUX

Question 11 : Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction strictement croissante sur \mathbb{R} et soit $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction strictement décroissante sur \mathbb{R} . Alors la composition $f \circ g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est strictement décroissante sur \mathbb{R} .

VRAI FAUX

Question 12 : Soit $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors l'image de f est un intervalle ouvert.

VRAI FAUX

Question 13 : Soient (a_n) et (b_n) deux suites de nombres réels positifs, telles que $0 < a_n \leq b_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Si la suite (b_n) converge, alors la suite (a_n) converge.

VRAI FAUX

Question 14 : La fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x + e^x$ est bijective.

VRAI FAUX